

DERMATOLOGIE ET VÉNÉRÉOLOGIE

Epreuve de vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Quelles sont les options thérapeutiques pour un mycosis fongoïde en plaques non infiltrées sur 4% de la surface corporelle, sans adénopathies palpables ?

Question N°2 :

Quel est le bilan d'imagerie conseillé pour un mycosis fongoïde en plaques non infiltrées sur 4% de la surface corporelle, sans adénopathies palpables ?

Question N°3 :

Quelles sont les 2 options thérapeutiques à privilégier pour un lymphome cutané primitif centrofolliculaire se manifestant par 2 lésions papuleuses infiltrées du décolleté (bilan d'extension négatif) ?

Question N°4 :

Quelle est la marge chirurgicale recommandée pour un mélanome de Breslow de 4 mm ulcéré ?

Question N°5 :

Quelles sont les indications de la recherche du ganglion sentinelle dans un mélanome primitif ?

Question N°6 :

Quelle est la marge chirurgicale recommandée pour un carcinome épidermoïde de la joue, de 10 mm de diamètre, bien différencié, de 5 mm d'épaisseur, sans engainement périnerveux ?

Question N°7 :

Citez les 4 effets secondaires cutanés les plus fréquents d'un traitement par anti PD-1.

Question N°8 :

Quelle classe médicamenteuse est utilisée dans les carcinomes basocellulaires avancés, inopérables ?

Question N°9 :

Quelles sont les 3 formes cliniques des carcinomes basocellulaires ?

Question N°10 :

Quelle est l'anomalie du bilan biologique standard que l'on peut observer au cours d'une pemphigoïde bulleuse ?

Question N°11 :

Citez deux cibles antigéniques du pemphigus.

Question N°12 :

Donnez la définition d'une érythrodermie.

Question N°13 :

Citez 3 atteintes viscérales pouvant mettre en jeu le pronostic vital dans le DRESS syndrome.

Question N°14 :

Quels sont les auto anticorps circulants à dépister en première intention dans la dermatite herpétiforme ?

Question N°15 :

Quel est le médicament indiqué dans le traitement des hémangiomes infantiles ?

Question N°16 :

Quelle lésion dermatologique doit vous faire suspecter un syndrome SACRAL/PELVIS/LUMBAR ? Précisez le type et la localisation.

Question N°17 :

Dans un contexte d'angiome plan, quelle est l'indication d'une IRM cérébrale chez un enfant asymptomatique ?



Question N°18 :

Donnez 2 biothérapies ayant l'AMM pour un enfant de 8 ans ayant un psoriasis sévère.

Question N°19 :

Donnez les 2 causes principales de l'érythème polymorphe chez l'enfant ?

Question N°20 :

Quel est le bilan paraclinique systématique faites-vous chez une femme jeune en cas de prescription de méthotrexate ?

Question N°21 :

Quelle est la principale biothérapie utilisée dans l'urticaire chronique spontanée ?

Question N°22 :

Quelle famille de médicaments est contre-indiquée dans la rosacée ?

Question N°23 :

Quelle est la durée pendant laquelle il ne faut plus prescrire d'anti-TNF en cas de survenue d'un cancer (sans récurrence) ?

Question N°24 :

Quelles sont les 2 principales maladies du système nerveux central à l'origine d'un prurit ?

Question N°25 :

Quel bilan faites-vous dans l'urticaire chronique lors de la prise en Charge ?

Question N°26 :

Quelle localisation d'arthrite des mains évoque fortement un rhumatisme psoriasique ?

Question N°27 :

Quelles sont les maladies cutanées pouvant être traitées par dupilumab selon l'AMM ?

Question N°28 :

Quel est le bilan à réaliser chez un patient lors de la découverte d'une IST ?

Question N°29 :

Quel l'agent pathogène associé aux lésions vulvaires de haut grade (exemple VIN ou maladie de Bowen) ?

Question N°30 :

Quel agent infectieux pathogène doit-on rechercher en cas d'urétrite non gonococcique et non chlamydia ?

Question N°31 :

Quel est le traitement de première intention d'une syphilis latente tardive chez un homme immunocompétent en l'absence d'allergie médicamenteuse connue (molécule et schéma thérapeutique) ?

Question N°32 :

Quel est le meilleur moyen thérapeutique de prévention primaire vis-à-vis des condylomes ?

Question N°33 :

Citez deux causes de trachyonychie.

Question N°34 :

Quel type de test cutané doit-on effectuer pour explorer un eczéma de contact ?

Question N°35 :

Quelle est la principale classe thérapeutique pouvant provoquer des angioedèmes bradykiniques d'origine médicamenteuse ?

Question N°36 :

Quels dosages doit-on demander en première intention devant une suspicion d'angioedème héréditaire ?

Question N°37 :

Quel traitement instituez-vous en cas d'échec d'un antihistaminique anti-H1 de 2^{ème} génération à 1 comprimé par jour pour une urticaire chronique spontanée ?

Question N°38 :

Quelle mesure thérapeutique est indispensable pour la cicatrisation d'un ulcère veineux ?

Question N°39 :

Citez deux facteurs de risque d'angiodermite nécrotique.

Question N°40 :

Citez deux types de pansement adaptés aux plaies très exsudatives.

Question N°41 :

Quelle molécule a l'autorisation en France dans le traitement des phénomènes de Raynaud sévères avec troubles trophiques en évolution ?

Question N°42 :

Citez deux étiologies de livédo nécrotique associé à une vasculite des vaisseaux de moyen calibre.

Question N°43 :

Citez deux mesures de prévention des plaies de décubitus (escarre).

Question N°44 :

Quels anticorps sont le plus souvent associés à une sclérodermie cutanée limitée ?

Question N°45 :

Que risque une femme enceinte porteuse d'un lupus subaigu avec anticorps anti Ro60/SSa ?

Question N°46 :

Quels sont les 2 examens à demander en première intention en cas de suspicion de sclérodermie systémique ?

Question N°47 :

Quels sont les 2 troubles trophiques caractéristiques de la sclérodermie systémique ?

Question N°48 :

La maladie de Still de l'adulte a pour critère majeur l'apparition d'un érythème. Quelle est sa particularité ?

Question N°49 :

Quels sont les examens biologiques à demander pour confirmer le diagnostic de syndrome des antiphospholipides ?

Question N°50 :

Citez 2 biothérapies (DCI) ayant l'AMM en France dans le lupus avec manifestations cutanée.