

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Où est située la deuxième portion du canal facial ?

Question N°2 :

Quel nerf assure l'innervation du platysma ?

Question N°3 :

Qu'est-ce que le sinus sigmoïde ? Où se situe-t-il ?

Question N°4 :

Qu'est-ce que la corde du tympan ? Quelle est sa fonction ?

Question N°5 :

Qu'est-ce que le promontoire ?

Question N°6 :

Quelle artère cérébelleuse est en rapport avec le « paquet acoustico-facial » (nerfs vestibulo-cochléaire, facial et intermédiaire) dans la fosse crânienne postérieure ?

Question N°7 :

Quel est le nerf qui innerve le muscle releveur de la paupière supérieure ?

Question N°8 :


Qu'est-ce que l'hélicotréma ?

Question N°9 :

Lors de la chirurgie de l'étrier, la deuxième portion du nerf facial est-elle visible ?


Question N°10 :

Donnez la légende des points 1 à 5.




Question N°11 :

Donnez la légende des points 1 à 5




Question N°12 :

Donnez la légende des points 1 à 5



Question N°13 :

Quel diagnostic peut-on évoquer devant ce résultat d'IRM chez un patient ayant présenté une paralysie faciale périphérique gauche ?




Question N°14 :

Quelles sont les principales complications possibles des cholestéatomes (en dehors des lésions tympano-ossiculaires) ?

Question N°15 :

Ce scanner des rochers a été demandé dans le cadre du bilan d'un cholestéatome de l'oreille gauche. Quelle extension particulière à risque est indiquée par une flèche sur cette imagerie ?




Question N°16 :

Quels sont les mécanismes physiopathologiques possibles d'un cholestéatome de l'enfant ?

Question N°17 :

Ce scanner des rochers a été demandé chez un enfant de 12 ans pour bilan d'une surdité de transmission unilatérale gauche à tympan normal. Quel diagnostic évoquez-vous d'après le résultat suivant ?



Question N°18 :

Quels sont les 2 germes les plus fréquemment retrouvés dans les otites moyennes aiguës bactériennes de l'enfant de plus de 18 mois ?

Question N°19 :


Quelles sont les deux techniques audiométriques utilisables dans le cadre du dépistage auditif néonatal ?

Question N°20 :

Un enfant de 9 ans sans antécédent consulte pour une sensation de baisse auditive droite. L'otoscopie est normale des deux côtés. Vous réalisez un test de Weber au diapason. L'enfant indique percevoir le son plus fort du côté gauche. Que vous indique ce résultat ?

Question N°21 :

Ce tympanogramme est réalisé chez un enfant de 6 ans ayant des antécédents d'otites à répétitions. Quelle(s) anomalie(s) observez-vous ? Comment interprétez-vous ce résultat ?



Question N°22 :

Quelle est l'origine la plus fréquente des causes infectieuses de surdité acquise pré et périnatale de l'enfant ? Précisez sa fréquence et le type de surdité occasionné.

Question N°23 :

Citez un type de surdité syndromique et un type de surdité non syndromique de l'enfant


Question N°24 :

Quel est le bilan étiologique à réaliser en cas de surdité de perception chez l'enfant ?

Question N°25 :

Sur cette image obtenue en laryngoscopie, nommez les 5 éléments indiqués





Question N°26 :


Quels sont les trois éléments utiles au fonctionnement de la voix normale ?

Question N°27 :

Devant une tumeur de la glande parotide, quels sont les signes cliniques en faveur d'un cancer ?

Question N°28 :

Chez cette patiente, âgée de 48 ans, présentant une dysphonie, une exposition au tabac depuis 25 ans, en observant la laryngoscopie ci-jointe, quelle est votre hypothèse diagnostique ?



Question N°29 :

Chez un enfant de 10 ans, en présence d'une tuméfaction médiane, lisse, régulière, située au contact de l'os hyoïde, sans dysphagie ni dyspnée, quelle est votre première hypothèse diagnostique ?

Question N°30 :

Chez un patient de 60 ans, devant une polyadénopathie cervicale, une altération de l'état général, un examen des voies aérodigestives supérieures normal, quel diagnostic doit-on évoquer en dehors des métastases de carcinome épidermoïde ?

Question N°31 :

En présence d'un corps étranger, enclavé dans le sinus piriforme, évocateur d'être un fragment osseux, quel signe clinique serait en faveur d'une effraction de la muqueuse du pharynx ?

Question N°32 :

Quel(s) examen(s) d'imagerie est (sont) recommandé(s) au cours du bilan d'une immobilité laryngée unilatérale gauche ?

Question N°33 :

Quelles sont les caractéristiques pathologiques de la voix chez un patient présentant une maladie de Parkinson ?

Question N°34 :

Vous prévoyez une prise en charge chirurgicale pour un patient qui présente un carcinome médullaire de la thyroïde. Quelles anomalies parfois associées peuvent compromettre le pronostic vital immédiat de votre patient si elles n'ont pas été dépistées et prises en charge avant l'intervention ?

Question N°35 :

Quelle est l'attitude thérapeutique en cas d'angine érythémato-pultacée chez un enfant de 6 ans ?

Question N°36 :

Citez 2 étiologies pouvant être à l'origine d'une paralysie récurrentielle bilatérale ?


Question N°37 :

Devant une ulcération de l'amygdale palatine, quels symptômes ou autres signes cliniques doivent faire évoquer un carcinome épidermoïde ?

Question N°38 :

Donnez la légende des éléments a, b et c.





Question N°39 :

Quel bilan paraclinique réalisez-vous devant un UCNT du cavum ?

Question N°40 :

Citez les éléments anatomiques cartilagineux et osseux à connaître lorsqu'on réalise une rhino-septoplastie post-traumatique

Question N°41 :

Quel geste chirurgical est à proposer devant une sinusite frontale aiguë bloquée, résistante à un traitement antibiotique ?

Question N°42 :

Quelles sont les caractéristiques à l'imagerie devant faire évoquer une sinusite fongique immuno-allergique ?

Question N°43 :

Quels sont les 3 types d'anosmie ?

Question N°44 :

Quels sont les autres symptômes rhinologiques à rechercher à l'interrogatoire chez un patient consultant pour obstruction nasale ?

Question N°45 :

Quelles sont les 3 étiologies à rechercher devant toute sinusite oedémato-purulente ?

Question N°46 :

Quel est le bilan paraclinique à réaliser devant une masse unilatérale de la fosse nasale chez un patient de 55 ans ?

Question N°47 :

Quels sont les risques évolutifs du papillome inversé ?

Question N°48 :


Citez 2 causes de rhinites en dehors de la rhinite allergique ?

Question N°49 :

Décrivez la prise en charge thérapeutique graduée de la polypose naso-sinusienne

Question N°50 :

Comment interprétez-vous l'image hyperdense dans le sinus maxillaire sur ce résultat de scanner ? Quel traitement proposez-vous ?



Question N°51 :

Quels sont les grands principes de prise en charge thérapeutique d'une ethmoïdite aiguë chez l'enfant ?

Question N°52 :

Quels sont les symptômes faisant évoquer une complication en cas de sinusite aigue ethmoïdo-frontale ?

Question N°53 :

Quel est le traitement antibiotique recommandé en première intention chez un patient présentant une sinusite maxillaire purulente aiguë, en absence d'allergie médicamenteuse ?

Question N°54 :

Quels sont les deux germes les plus fréquemment retrouvés dans les rhino-sinusites aiguës bactériennes ?



Question N°55 :

Que doit rechercher l'examen clinique d'un patient pris en charge en urgence pour une fracture des os propres du nez suite à une rixe ?