

PNEUMOLOGIE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Que recherchez-vous comme étiologie devant une toux évoluant depuis au moins 8 semaines à radiographie thoracique normale ?

Question N°2 :

Dans quel cas est-il proposé de réaliser un geste de symphyse pleurale dès le premier épisode de pneumothorax spontané primaire (PSP) ?

Question N°3 :

Qu'évaluez-vous chez un sujet qui veut arrêter de fumer ?

Question N°4 :

Quelle(s) étiologie(s) doit(vent) être systématiquement évoquée(s) devant une pleurésie exsudative lymphocytaire ?

Question N°5 :

Dans quelles situations, une infection tuberculose latente devra-elle être traitée ?

Question N°6 :

Quel est le tableau radiologique en faveur d'une fibrose pulmonaire idiopathique ?
Quelles sont les lésions élémentaires et leur topographie ?

Question N°7 :

Quel est le bilan biologique de 1 ère intention devant une pneumopathie interstitielle diffuse ?

Question N°8 :

Décrivez la cellularité d'un lavage broncho-alvéolaire normal.

Question N°9 :

Citez les 2 schémas possibles du traitement antibiotique de la coqueluche chez l'adulte selon les recommandations 2024.

Question N°10 :

Citez 4 causes non infectieuses à évoquer devant des nodules pulmonaires excavés ?



Question N°11 :

Quelles sont les 2 étiologies génétiques à évoquer chez un enfant devant la découverte de dilatation des bronches diffuses et leurs méthodes de dépistage ?

Question N°12 :

Selon les bonnes pratiques cliniques, quels sont les 2 examens à envisager chez un patient présentant des dilatations des bronches avant la prescription de macrolides au long cours et dans quel but ?

Question N°13 :

Quelles sont les 5 grands groupes d'hypertension pulmonaire d'après la classification clinique des hypertensions pulmonaires ? Parmi ceux-ci, quelles sont les 2 groupes les plus fréquents ?

Question N°14 :

En cas de découverte d'hypertension artérielle pulmonaire chez une femme de 40ans, quel bilan biologique devez-vous réaliser à visée étiologique ?

Question N°15 :

Quelle est la durée d'anticoagulation pour un premier épisode d'embolie pulmonaire chez une femme jeune sous contraception oestro-progestative ?

Question N°16 :

Quels seuils de VEMS post-opératoire sont retenus pour juger de l'opérabilité d'un cancer pulmonaire ?

Question N°17 :

Quels éléments cliniques et liés à la tumeur sont indispensables au diagnostic pour décider du traitement de 1e ligne d'un carcinome épidermoïde bronchique de stade avancé ?

Question N°18 :

Un patient de 72 ans se présente avec un adénocarcinome bronchique stade 4. Vous envisagez une association chimiothérapie immunothérapie. Donnez trois critères de l'interrogatoire qui pourraient vous faire changer d'option ?

Question N°19 :

Vous rencontrez un patient de 75 ans porteur d'une lésion de 3 cm du lobe supérieure droit. Il a beaucoup fumé, est porteur d'une BPCO stade 4E, d'une insuffisance coronarienne avec stent actif posé il y a moins de trois mois. Vous envisagez une irradiation en condition stéréotaxique sans histologie. Quels critères vous seront réclamés en RCP ?

Question N°20 :

Quels critères vous conduisent à envisager une biothérapie chez un patient asthmatique ?

Question N°21 :

Quels principaux facteurs aggravants recherchez-vous devant un asthme non contrôlé ?

Question N°22 :

Quels sont les bénéfices attendus de la réadaptation respiratoire dans la BPCO ?

Question N°23 :

Quels diagnostics différentiels de la sarcoïdose sont à évoquer devant des granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires ?