

PSYCHIATRIE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Quels sont les critères diagnostiques d'un trouble neurocognitif majeur ?

Question N°2 :

Quelles sont les grandes étapes d'un bilan étiologique et différentiel d'un trouble neurocognitif ?

Question N°3 :

Quels documents sont nécessaires pour une admission en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Représentant de l'Etat - SPDRE ?

Question N°4 :

Quels sont les certificats nécessaires au maintien de l'hospitalisation complète en SPDRE ?

Question N°5 :

Quelles sont les différentes modalités des sorties temporaires ?

Question N°6 :

Quels sont les deux outils standardisés utilisés pour le diagnostic de TSA ?



Question N°7 :

L'autisme est-il toujours héréditaire ?

Question N°8 :

Y a-t-il toujours un retard de langage chez l'enfant porteur de TSA ?

Question N°9 :

Quel examen est à faire en premier lieu chez un enfant présentant un trouble de communication ?

Question N°10 :

Quelles sont les modalités de prescription du méthylphénidate chez l'enfant ?

Question N°11 :


Devant un premier épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère, quels sont les deux types de traitement (médicamenteux ou non) les plus appropriés ?

Question N°12 :

Quelle est la durée habituelle pour voir apparaître les effets d'un traitement par escitalopram dans le cadre d'un premier épisode dépressif caractérisé (indiquez une fourchette de temps) ?

Question N°13 :

Combien de temps doit-on poursuivre le traitement antidépresseur devant un premier épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère.



Question N°14 :

Quels sont les deux traitements (médicamenteux ou non) recommandés en cas de d'épisode dépressif caractérisé sévère ayant résisté à plusieurs lignes de traitements antidépresseurs ?

Question N°15 :

Citez 2 antidépresseurs de classe thérapeutique différente (en dehors du citalopram ou de l'escitalopram), leur classe thérapeutique et la dose recommandée à visée thérapeutique dans la dépression.

Question N°16 :

Sur l'analyse de quels critères se fonde l'évaluation d'une crise suicidaire ?

Question N°17 :

Donnez la définition d'une personne suicidante

Question N°18 :

Quels sont les critères d'évaluation de l'urgence suicidaire ?

Question N°19 :

Quels sont les critères de danger à rechercher chez un patient en crise suicidaire ?

Question N°20 :

Chez un patient en situation de crise suicidaire quelle est la condition nécessaire au désamorçage de la crise et à maintenir tout le long de la prise en charge ?



Question N°21 :

Dans l'Anorexie Mentale donnez la triade clinique classique du diagnostic.

Question N°22 :

Quel critère n'appartient plus aux critères diagnostiques de l'Anorexie Mentale depuis le DSM-5 ?

Question N°23 :

Citez les 2 principaux comportements compensateurs dans l'Anorexie Mentale.

Question N°24 :

Dans l'Anorexie Mentale il existe des critères biologiques de gravité. Citez 2 anomalies biologiques reflétant des dysfonctions d'organes.

Question N°25 :

Quel principal signe clinique permet de différencier la Boulimie Hyperphagique (ou Bing Eating Disorder) de la Boulimie Nerveuse (Boulimia Nervosa) ?

Question N°26 :

Dans la Boulimie Nerveuse quelle classe de traitement psychotrope peut être proposée afin de réduire les crises boulimiques ?

Question N°27 :

Donnez le nom d'une molécule qui a l'AMM dans le traitement de la Boulimie Nerveuse.

Question N°28 :

Citez et classez les traitements addictolytiques (en DCI) du trouble de l'usage d'alcool en cas d'objectif d'abstinence, en termes de médicaments de première ou de deuxième intention.

Question N°29 :

Quelles sont les 3 principaux signes d'intoxication sévère aux opiacés ?
Quel est le nom de l'antidote à une intoxication sévère aux opiacés ?

Question N°30 :

Principes de prise en charge prophylactique du trouble bipolaire de type1 ?

Question N°31 :

Décrivez les deux grandes catégories de symptômes négatifs ?

Question N°32 :

Citez des causes de symptômes négatifs secondaires ?

Question N°33 :

Décrivez les traitements des symptômes négatifs.