

CF-11-Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique-QCM-EVC-2025

Q 1. le lambeau de grand dorsal : donnez les réponses exactes

- a) est vascularisé par le pédicule huméral
 - b) ne peut pas être préalablement expansé
 - c) peut être utilisé avec une épargne musculaire pour limiter les séquelles fonctionnelles
 - d) est un type II de la classification de Mathes et Nahai
 - e) n'atteint pas le sommet du crâne en pédiculé
-

Q 2. le syndrome du canal carpien : donnez les réponses exactes

- a) c'est le nerf radial qui est comprimé au coude
 - b) c'est le nerf cubital qui est comprimé au coude
 - c) c'est la nerf médian qui est comprimé au poignet
 - d) il est souvent bilatéral
 - e) il n'y a jamais de déficit moteur
-

Q 3. A propos de la réduction mammaire : donnez les réponses exactes

- a) l'aréole peut souffrir ou même se nécroser
 - b) les cicatrices sont souvent en forme de L
 - c) l'allaitement n'est plus jamais possible
 - d) les variations pondérales post-opératoires sont mauvaises pour la qualité du résultat
 - e) l'hématome est une complication assez fréquente
-

Q 4. le doigt en boutonnière : quelles sont les réponses exactes

- a) l'articulation interphalangienne distale est en hyperextension
 - b) l'articulation interphalangienne proximale est en flexion
 - c) est du à une lésion de la bandelette médiane du tendon extenseur
 - d) est du à une lésion du tendon fléchisseur profond
 - e) est le plus souvent d'origine rhumatoïde
-

Q 5. à propos du mélanome, quels sont les indices pronostics utilisés ?

- a) l'indice de Furlow
 - b) l'indice de Baux
 - c) l'indice de Breslow
 - d) l'indice de Magalon
 - e) l'indice de Clarke
-

Q 6. Concernant les complications des ulcères de jambe, donnez les réponses exactes ?

- a) Névralgie crurale
 - b) Tétanos
 - c) Erysipèle
 - d) Dégénérescence
 - e) Hémorragie
-

Q 7. à propos des greffes de peau, quelles sont les réponses exactes :

- a) Les greffes de peau totale prennent plus facilement que les greffes de peau mince
 - b) Les greffes de peau totale rétractent davantage que les greffes de peau mince
 - c) La greffe cutanée entraîne moins d'hypertrophie et de rétraction cicatricielles que la cicatrisation dirigée
 - d) L'aspect en filet des greffes amplifiées ne disparaît pas avec le temps
 - e) Le site de prélèvement des greffes de peau mince cicatrise en moyenne en 15 jours
-

Q 8. A propos du lambeau sural : quelles sont les réponses exactes ?

- a) C'est un lambeau neuro-fasciocutané
 - b) il est fiable et reproductible
 - c) Sa dissection sacrifie un axe vasculaire principal de la jambe
 - d) il est utile pour la couverture du 1/4 de la jambe et la cheville
 - e) son prélèvement emporte la veine petite saphène
-

Q 9. concernant les séquelles de brûlures profondes, quelles sont les réponses exactes ?

- a) La pressothérapie par vêtement compressif est essentielle
 - b) Pour les mains les postures avec des attelles ne sont pas utiles
 - c) Après cicatrisation initiale les cicatrices sont inflammatoires pendant environ 6 mois
 - d) Les brides rétractiles sont fréquentes dans les zones articulaires
 - e) les orthèses de compression et de positionnement sont volontiers utilisées
-

Q 10. Concernant le ptosis, quelles sont la ou les réponses exactes :

- a) il peut être traité par la toxine botulinique
 - b) il est associé à une mydriase dans le syndrome de Claude Bernard Horner
 - c) la mise en place de plaque d'or dans la paupière est le traitement habituel
 - d) le muscle de Muller peut être dysfonctionnel
 - e) il peut être congénital, sénile ou traumatique
-

Q 11. Concernant les complications de la septo-rhinoplastie : quelles sont les réponses exactes :

- a) La récurrence de la déviation septale
 - b) Le manque de définition de la pointe du nez en cas de voie directe dite "externe"
 - c) Le corbin cartilagineux
 - d) Les douleurs dans les articulations temporo-mandibulaires
 - e) Les irrégularités cutanées visibles sur l'arrête
-

Q 12. Concernant le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) et les prothèses mammaires, quelles sont les réponses exactes :

- a) Le délai moyen d'apparition après la pose des implants est d'un an
 - b) Les implants macrotexturés sont fréquemment mis en cause
 - c) les cellules tumorales expriment de façon constante le marqueur CD30
 - d) Cliniquement la patiente présente volontiers un épanchement périprothétique tardif
 - e) Le pronostic est habituellement mauvais dans tous les cas, avec faible survie à 5 ans
-

Q 13. à propos du lambeau de DIEP : quelles sont les réponses exactes :

- a) C'est un lambeau perforant cutanéograsseux
 - b) Il est vascularisé par l'artère épigastrique superficielle
 - c) Son prélèvement crée systématiquement une éventration
 - d) Les vaisseaux perforants peuvent être repérés par l'angioscanner
 - e) Son prélèvement engendre une cicatrice abdominale transversale assez basse et une péri-ombilicale
-

Q 14. à propos du lambeau de jumeau (gastrocnémien) : quelles sont les réponses exactes :

- a) Les deux chefs médial et latéral possèdent un pédicule vasculaire indépendant
 - b) Le pédicule est proximal, autorisant une rotation antérieure du muscle vers le genou
 - c) Il est utile pour la couverture du tiers moyen de la jambe
 - d) Le lambeau peut survivre après section de l'artère poplitée
 - e) Le jumeau latéral est moins utilisé que le médial à cause de la proximité du nerf sciatique poplité externe.
-

Q 15. à propos des sarcomes des parties molles : quelles sont les réponses exactes ?

- a) La biopsie excisionnelle est toujours recommandée en première intention
 - b) L'IRM est l'examen de référence pour le bilan loco-régional
 - c) Le scanner thoracique est systématique pour la recherche de métastases pulmonaires
 - d) Les biopsies doivent idéalement être réalisées à distance de la zone de la future exérèse
 - e) La radiothérapie est souvent indiquée pour les sarcomes de haut grade > 5 cm
-

Q 16. à propos des complications du lifting cervico-facial : quelles sont les réponses exactes ?

- a) Le nerf trijumeau peut être lésé
 - b) La souffrance cutanée est plus fréquente en cas de tabagisme
 - c) Le rameau mandibulaire du nerf facial peut être lésé
 - d) Les difficultés pour s'alimenter en post-opératoires sont fréquentes
 - e) Les troubles auditifs et les otites moyennes aiguës sont fréquents
-

Q 17. Concernant la blépharoplastie esthétique : quelles sont les réponses exactes ?

- a) pour la paupière supérieure l'incision est habituellement située dans le pli palpébral supérieur
 - b) le geste peut comporter une résection cutanée, musculaire et graisseuse
 - c) un geste intraorbitaire est toujours nécessaire
 - d) le glaucome non traité est une contre-indication
 - e) la plicature du releveur de la paupière est systématique
-

Q 18. à propos du lambeau antérolatéral de la cuisse : quelles sont les réponses exactes ?

- a) L'axe vasculaire principal est une branche de l'artère circonflexe iliaque superficielle
 - b) La dissection peut altérer le nerf cutané latéral de la cuisse
 - c) Le site donneur est rarement autofermant
 - d) C'est un lambeau perforant
 - e) Le pédicule principal est septo-cutané ou musculocutané
-

Q 19. Concernant les complications de la dermolipectomie des membres inférieurs : quelles sont les réponses exactes ?

- a) La phlébite des membres inférieurs
 - b) Les désunions cicatricielles
 - c) Le relâchement secondaire des tissus avec présence d'irrégularités cutanées
 - d) L'hématome
 - e) Les lymphocèles
-

Q 20. Concernant le carcinome épidermoïde (CE), quelles sont les réponses exactes ?

- a) il survient sur les zones photo-exposées
 - b) le CE est une tumeur fréquente chez le jeune adulte
 - c) le CE est une tumeur très lymphophile
 - d) le CE est souvent une évolution d'une kératose actinique préalable
 - e) la radiothérapie peut compléter le traitement d'exérèse chirurgicale
-

Q 21. Concernant les oreilles décollées, quelles sont les réponses exactes ?

- a) les oreilles décollées associent dans certains cas un défaut de plicature de l'hélix et une hypertrophie de conque
 - b) le traitement chirurgical des oreilles décollées relève du domaine de la chirurgie esthétique (non prise en charge par l'assurance maladie)
 - c) l'otoplastie peut se compliquer d'une chondrite de l'oreille externe
 - d) l'otoplastie est réalisée dans l'idéal au moment de la puberté
 - e) l'apparition d'une cicatrice chéloïde dans le sillon rétro-auriculaire fait partie de l'évolution naturelle post-opératoire
-

Q 22. Vous réaliser l'exérèse d'un carcinome basocellulaire étendu de la région du canthus interne chez un patient de 75 ans : Quelles sont les propositions exactes ?

- a) Vous opérez le patient sans le compte rendu de la consultation pluridisciplinaire qui n'a pas pu être rédigé
 - b) Vous faites une exérèse avec une marge de sécurité d'au moins 1 cm
 - c) Vous envoyez la pièce opératoire en monobloc en anatomopathologie
 - d) Vous utilisez de préférence le bistouri monopolaire
 - e) Vous orientez la pièce avant de l'envoyer en examen anatomopathologique
-

Q 23. à propos de la check liste : quelles sont les réponses exactes ?

- a) Son utilisation est une exigence légale
 - b) Elle ne concerne que l'anesthésiste et l'infirmière de la salle opératoire
 - c) Elle comporte deux volets : pré et peropératoire
 - d) Elle permet d'éviter les erreurs notamment de patient ou de matériel
 - e) Elle peut être réclamée lors d'une mise en cause pour une complication postopératoire
-

Q 24. Concernant les cicatrices hypertrophiques, quelles sont les réponses exactes ?

- a) sont des cicatrices rouges et en relief
 - b) ont un aspect en patte de crabe
 - c) sont moins fréquentes en cas de brûlures
 - d) évolue sur une durée de 1 à 2 ans chez l'enfant
 - e) finissent par se normaliser
-

Q 25. A propos de l'hémangiome infantile : quelles sont les réponses exactes ?

- a) est dans la plupart des cas de grande taille
 - b) est plus fréquent chez les prématurés
 - c) se situe souvent au niveau des pieds
 - d) peut s'ulcérer
 - e) a une évolution en trois phases : croissance régression séquelles
-

Q 26. Concernant la couverture des pertes de substance : quelles sont les réponses fausses ?

- a) la thérapie par pression négative est principalement utilisée pour accélérer la détersion
 - b) une greffe de peau totale ne laisse pas de cicatrice au niveau du site donneur
 - c) une greffe de peau mince expansée est utilisée pour couvrir des petites surfaces
 - d) la technique de référence pour couvrir une perte de substance avec un sous-sol non vascularisé est la greffe de peau totale
 - e) un lambeau peut être pédiculé ou libre
-

Q 27. Parmi les propositions concernant les différents types de lambeaux cutanés, quelles sont les réponses fausses

- a) le lambeau en Z est un lambeau de rotation
 - b) le sevrage d'un lambeau cutané est basé sur le principe de revascularisation derme à derme
 - c) le lambeau en LLL est un lambeau axé sur un pédicule vasculaire
 - d) le lambeau frontal est un lambeau au hasard de transposition
 - e) la plastie en trident est volontiers utilisée pour casser les brides axillaires
-

Q 28. Concernant le traitement chirurgical de l'escarre, quelles sont les réponses exactes ?

- a) la cicatrisation dirigée fait partie intégrante des traitements des escarres
 - b) les lambeaux musculaires sont fiables
 - c) les escarres talonnières sont traitées par greffe de peau
 - d) les lambeaux cutanés sont les plus utilisés
 - e) un geste chirurgical de couverture est proposé aux escarres de stade I
-

Q 29. A propos de la syndactylie : quelles sont les réponses exactes ?

- a) Elle ne concerne que les mains
 - b) Elle est la plus souvent acquise et cicatricielle
 - c) La consultation de génétique est utile
 - d) Elle ne concerne que la 3ème commissure
 - e) La correction chirurgicale nécessite le plus souvent des greffes de peau
-

Q 30. Concernant la reconstruction mammaire par prothèse : quelles sont les propositions vraies ?

- a) Elle peut être indiquée après mastectomie totale avec préservation cutanée
 - b) La voie d'abord est souvent celle de la mastectomie initiale
 - c) La reconstruction bilatérale est contre-indiquée
 - d) Le remplacement des prothèses est systématique et impérative tous les 10 ans
 - e) La mise en place d'un expandeur cutané avant l'implant définitif est souvent nécessaire
-

Q 31. Concernant la chirurgie de l'hypertrophie mammaire : quelles sont les propositions exactes ?

- a) Un bilan sénologique est obligatoire avant l'intervention
 - b) Les techniques utilisables en pratique peuvent être des techniques à pédicule supérieur, pédicule inférieur, pédicule central, greffe libre d'aréole, technique sous-cutanée sans cicatrice
 - c) Des drains sont systématiquement posés
 - d) Un soutien-gorge de contention est recommandé en post-opératoire
 - e) L'allaitement est toujours impossible après l'intervention
-

Q 32. Parmi les propositions suivantes concernant le lambeau interosseux postérieur, quelles sont les réponses fausses ?

- a) Il est vascularisé par l'artère interosseuse postérieure
 - b) Les vaisseaux vascularisant le lambeau sont situés dans un septum limité par l'extenseur commun des doigts et l'extenseur ulnaire du carpe
 - c) Il peut couvrir jusqu'aux articulations métacarpo-phalangiennes des doigts longs
 - d) Il peut couvrir toute la face dorsale du pouce
 - e) L'artère interosseuse postérieure s'anastomose habituellement à sa terminaison avec une branche de l'artère radiale
-

Q 33. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic de récupération après une plaie d'un nerf digital : donnez les réponses exactes

- a) Délai long de prise en charge par rapport au traumatisme
 - b) Traumatisme par écrasement
 - c) Age jeune
 - d) Tabagisme
 - e) Absence de rééducation sensorielle
-

Q 34. Concernant le syndrome de Poland, quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Prédominance féminine
 - b) L'hypoplasie mammaire est fréquente chez la femme
 - c) L'absence du chef sternal du grand pectoral est caractéristique
 - d) Le muscle petit pectoral est toujours absent
 - e) C'est une pathologie héréditaire autosomique dominante
-

Q 35. En ce qui concerne l'anatomie de la paupière, quelles sont les propositions exactes ?

- a) Le muscle orbiculaire permet l'ouverture de la paupière
 - b) Le muscle releveur de la paupière supérieure est innervé par le nerf III
 - c) Le muscle de Müller est un muscle d'innervation sympathique
 - d) Le muscle releveur s'insère au bord supérieur du tarse
 - e) Le muscle orbiculaire est innervé par le nerf trijumeau
-

Q 36. Une greffe de peau totale correspondant à : donnez les réponses fausses ?

- a) Une greffe comprenant seulement l'épiderme
 - b) Une greffe comprenant l'épiderme et tout le derme
 - c) Une greffe comprenant l'hypoderme
 - d) Une greffe qui concerne les annexes cutanées
 - e) Une greffe qui peut être prélevée au dermatome
-

Q 37. À propos du lambeau scapulaire, quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Il est classé comme un lambeau fasciocutané à pédicule artériel
 - b) Il est classé comme un lambeau cutané à pédicule direct
 - c) Il est classé comme un lambeau perforateur
 - d) Il est classé comme un lambeau musculocutané
 - e) Il peut être prélevé comme un lambeau composite
-

Q 38. Concernant la fasciite nécrosante : quelles sont les réponses exactes ?

- a) est une infection due au Streptocoque Béta-hémolytique
 - b) est une infection qui évolue lentement
 - c) est une urgence vitale
 - d) l'échographie permet de faire le diagnostic
 - e) le traitement chirurgical nécessite un drainage sans parage des tissus
-

Q 39. Quels sont les critères qui rentrent en compte dans la gravité d'une brûlure : quelles sont les réponses exactes ?

- a) Les âges extrêmes de la vie
 - b) l'aspect circulaire d'une brûlure de 3^{ème} degré d'un membre
 - c) la localisation à distance des orifices
 - d) l'absence de comorbidité
 - e) une surface de 30% de brûlure du 1^{er} degré
-

Q 40. à propos du lambeau frontal, quelles sont les réponses exactes ?

- a) sa dissection profonde se fait dans un seul plan
 - b) le site donneur est presque toujours autofermant sur toute sa hauteur
 - c) il nécessite un temps de sevrage secondaire
 - d) c'est un lambeau à pédicule axial
 - e) il est très utilisé pour la reconstruction des lèvres
-