

# BLANC-CF-10-Chirurgie pédiatrique-QCM-EVC-2025

**Q 1. La boiterie fébrile chez l'enfant doit être considérée en première intention comme**

- ☐ a) Une synovite transitoire
  - ☒ b) Une infection ostéo-articulaire
  - ☐ c) Une apophysite de croissance
  - ☐ d) Une ostéochondrite primitive de hanche
  - ☐ e) Une fracture sous-périostée
- 

**Q 2. Parmi les examens d'imagerie, lequel est considéré comme le "gold standard" pour confirmer une infection ostéo-articulaire ?**

- ☐ a) Radiographie standard
  - ☐ b) Échographie
  - ☐ c) Scintigraphie osseuse
  - ☒ d) IRM
  - ☐ e) Scanner
- 

**Q 3. La maladie de Legg-Calvé-Perthes correspond à**

- ☐ a) Une épiphysiolyse fémorale supérieure
  - ☒ b) Une nécrose avasculaire de l'épiphyse fémorale supérieure
  - ☐ c) Une ostéomyélite aiguë métaphysaire
  - ☐ d) Une apophysite de croissance
  - ☐ e) Une tumeur osseuse bénigne
- 

**Q 4. Parmi les facteurs suivants, lequel est reconnu comme facteur de risque de luxation congénitale de hanche ?**

- ☒ a) Antécédent familial au 1er degré
  - ☐ b) Naissance par césarienne programmée
  - ☐ c) Sexe masculin
  - ☐ d) Présentation céphalique
  - ☐ e) Prématuration
- 

**Q 5. Laquelle des complications suivantes peut survenir après traitement de la luxation congénitale de hanche ?**

- ☒ a) Ostéonécrose post-réductionnelle
  - ☐ b) Hernie inguinale
  - ☐ c) Pied bot
  - ☐ d) Hernie discale
  - ☐ e) Pectus excavatum
- 

**Q 6. En présence d'une malformation anale, il convient de rechercher :**

- ☒ a) une anomalie vertébrale
  - ☐ b) une hernie diaphragmatique
  - ☐ c) une malformation des voies biliaires
  - ☒ d) une anomalie des voies urinaires
  - ☒ e) une anomalie cardiaque
-

**Q 7. Chez un nourrisson de 5 semaines qui présente des vomissements blanchâtres fréquents, quel(s) diagnostic(s) peut ou peuvent être évoqués ?**

- ☐ a) une constipation
  - ☒ b) un reflux gastro-oesophagien
  - ☒ c) une sténose hypertrophique du pylore
  - ☐ d) une bride intestinale
  - ☐ e) une atrésie duodénale
- 

**Q 8. Parmi les signes suivants le ou lesquels est ou sont en faveur du diagnostic de la maladie de Hirschsprung ?**

- ☒ a) l'absence d'émission spontanée du méconium
  - ☒ b) un refus de l'alimentation avec ballonnement abdominal
  - ☐ c) une sténose anale
  - ☒ d) des vomissements
  - ☐ e) l'absence d'émission de gaz ou matières au toucher rectal
- 

**Q 9. Parmi les anomalies suivantes la ou lesquelles peut ou peuvent s'associer préférentiellement à l'atrésie de l'œsophage ?**

- ☐ a) une omphalocèle
  - ☒ b) une malformation ano-rectale
  - ☒ c) une atrésie duodénale
  - ☒ d) une agénésie rénale
  - ☒ e) une microgastrie
- 

**Q 10. En présence d'une dilatation pyélique et urétérale unilatérale chez un garçon de 6 mois qui a présenté une pyélonéphrite, la ou lesquelles des propositions suivantes doit ou doivent être réalisées ?**

- ☒ a) une urétrocystographie rétrograde
  - ☐ b) une IRM médullaire
  - ☒ c) une scintigraphie rénale
  - ☐ d) une pyélographie par ponction des cavités rénales
  - ☐ e) une urétéropyélographie rétrograde
-