

## QCM Blanc

**Parmi les propositions suivantes, quelles sont les réponses justes :**

- A. Le tamoxifène est indiqué en première ligne dans le cancer du sein hormonodépendant chez la femme non ménopausée.
- B. L'erlotinib est indiqué en première ligne dans le cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec des mutations activatrices de PD-L1.
- C. Le carboplatine induit fréquemment une augmentation de la créatininémie.
- D. Le 5-fluorouracile est classiquement associé à l'acide folinique et à l'oxaliplatine dans les cancers colorectaux.
- E. Le docétaxel induit fréquemment une neuropathie périphérique.

**Réponses : A, D et E**

**Parmi les propositions suivantes, quelles sont les réponses justes :**

- A. La ciprofloxacine est classiquement associée à un risque de tendinopathie.
- B. La prescription d'amikacine devra être associée à une surveillance de la fonction auditive.
- C. L'association triméthoprim sulfaméthoxazole doit être évitée pendant la grossesse dû à un risque tératogène.
- D. L'amoxicilline sera le traitement de première intention des pneumonies aiguës communautaires sans signe de gravité.
- E. Dans la cystite aiguë simple sans facteur de risque de complication, une fluoroquinolone sera indiquée en première intention.

**Réponses : A, B, C, D**

**Quelles sont la ou les surveillance(s) biologique(s), nécessaire(s) à l'analyse pharmaceutique de la prescription suivante :**

*rivaroxaban 20 mg : 1 cp le soir.*  
*atorvastatine 20 mg : 1 cp par jour.*  
*amiodarone 200 mg : 1 cp par jour.*  
*bisoprolol 10 mg : 1 cp par jour.*  
*nicardipine 20 mg : 1 cp par jour.*  
*furosémide 40 mg : 1 cp par jour.*  
*sitagliptine-metformine 50/1000 mg : 1 cp matin et soir.*  
*paracétamol 500 mg : 2 cp matin, midi et soir si douleur.*

- A. Clairance de la créatinine
- B. INR (international normalized ratio)
- C. Hémoglobine
- D. Potassium
- E. Facteur V (proaccélérine)

**Réponses : A, C, D**

**Parmi les propositions suivantes, quelles sont les réponses justes :**

- A. Le correspondant local de matériovigilance est désigné par le directeur de l'hôpital après avis de la commission médicale d'établissement
- B. Le correspondant local matériovigilance doit être pharmacien
- C. Tout professionnel de santé peut faire une déclaration de matériovigilance
- D. La matériovigilance s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, qu'ils soient marqués CE ou non
- E. En cas d'événement grave suite à l'utilisation d'un dispositif médical, un signalement doit être réalisé à la HAS (haute Autorité de Santé)

**Réponses : A, C, D**

**Les pharmacies hospitalières peuvent préparer des solutions de mélanges d'antibiotiques sous forme de collyres , parmi les propositions suivantes, quelles sont les réponses justes :**

- A- permettent de répondre à une rupture d'approvisionnement
- B- sont produites dans une zone d'atmosphère contrôlée de classe A
- C- présentent une durée de stabilité avant ouverture de 6 mois
- D- ont un temps de résidence à la surface de l'œil prolongé
- E- sont limpides

**Réponses : B,E**

**Concernant l'étape de pré-désinfection manuelle des dispositifs médicaux stériles, quelles affirmations sont correctes ?**

- A- Elle a pour objectif de réduire la charge microbienne avant le nettoyage et la stérilisation
- B- Elle contribue à limiter la formation de biofilm
- C- Elle doit être réalisée immédiatement après l'utilisation des dispositifs, idéalement dans l'unité de soins
- D- Elle nécessite le respect de protocoles précis, incluant la nature des produits à utiliser, la concentration et la durée de contact à respecter
- E- Le prétraitement manuel par vaporisation est la technique de référence

**Réponses : A,B,C,D**

**Parmi les propositions suivantes lesquelles sont les éléments d'évaluation de la gestion de la qualité en pharmacie hospitalière ?**

- A-système de maîtrise des non-conformités
- B-procédures d'auto-évaluation
- C-inspection par l'ANSM
- D-Manuel qualité
- E-Formation du personnel à la démarche qualité

**Réponses : A,B,D,E**