

BLANC-CF-76-Gériatrie-QCM-EVC-2025

QCM 1 : Parmi les propositions suivantes concernant les liens entre troubles neurocognitifs et chute, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. Dès le stade MCI, existe des troubles de l'équilibre
- B. Les troubles des fonctions exécutives sont fortement associés au risque de chute.
- C. Les chutes apparaissent habituellement plus tard dans la démence à corps de Lewy que dans la maladie d'Alzheimer.
- D. La prévalence de l'hypotension orthostatique est augmentée dans la maladie d'Alzheimer.
- E. L'efficacité des interventions multifactorielles pour réduire le risque de chute chez les personnes âgées est mieux démontrée en milieu institutionnel qu'en ville.

Réponses : A, B, D

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes concernant la fragilité, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. La fragilité se définit comme une diminution des performances maximales de l'individu.
- B. La chute est un marqueur de fragilité.
- C. La fragilité est une étape obligée vers la dépendance.
- D. La fragilité est la conséquence d'une cascade gériatrique.
- E. La fragilité est considérée comme un état irréversible.

Réponse : B

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes concernant les conséquences du vieillissement physiologique, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. Altération de la fonction systolique ventriculaire gauche
- B. Diminution de la sensation de soif
- C. Diminution du rapport masse grasse/masse maigre
- D. Augmentation de la TSH
- E. Augmentation de la glycémie à jeun

Réponse : B

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes concernant la dépression de la personne âgée, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?

- A. Dans la dépression masquée, les plaintes sont somatiques
- B. Le risque de suicide est plus élevé chez l'homme âgé que chez l'adulte jeune
- C. Les antidépresseurs imipraminiques ne sont pas conseillés en première intention chez le sujet âgé du fait d'une efficacité réduite
- D. La sismothérapie est indiquée chez le sujet âgé en cas de dépression sévère résistante
- E. La durée du traitement antidépresseur doit être d'au moins 12 mois après disparition des signes cliniques dans le cadre d'un premier épisode

Réponse : A, B, D, E

QCM 5 : A l'occasion de la visite de préadmission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'une femme de 85 ans, vous vérifiez son statut vaccinal. Ses antécédents comprennent : implant cochléaire posé il y a deux ans, insuffisance rénale post-infectieuse depuis 10 ans, chutes fréquentes. Que préconisez-vous ? une ou plusieurs réponse(s) juste(s) :

- A. Administration annuelle du vaccin antipneumococcique
- B. Administration annuelle du vaccin antigrippal
- C. Administration biannuelle de la vaccination COVID-19
- D. Vaccination contre l'hépatite B
- E. Vaccination contre le zona

Réponses : B, C, E

QCM 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la paralysie supra-nucléaire progressive, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. Comprend des chutes précoces
- B. Répond mal à la L Dopa
- C. Doit être traitée par agonistes dopaminergiques
- D. Comprend des troubles de l'oculomotricité
- E. Comprend des hallucinations précoces

Réponses : A, B, D

QCM 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la prescription des hypnotiques pour un trouble du sommeil chez le patient atteint de maladie neurodégénérative, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. En 1^{re} intention, il faut privilégier les thérapies non médicamenteuses et les bonnes pratiques de sommeil.
- B. La zopiclone doit être utilisée de préférence à demi dose.
- C. Lorsqu'une BZD est déjà prescrite, il est recommandé d'associer un hypnotique.
- D. L'efficacité des benzodiazépines et des hypnotiques peut être évaluée après 48 heures de traitement.
- E. Le rapport bénéfice/risque doit être évalué de façon individuelle et au cas par cas.

Réponses : A, B, E

QCM 8 : Parmi les propositions suivantes quel(s) est(sont) le(s) critère(s) d'utilisation de la demi-dose d'apixaban (2,5 mg X 2 / jour) dans le fibrillation atriale chez la personne âgée ?

- A. Insuffisance rénale légère (ClCr 51–80 ml/min)
- B. Insuffisance hépatique sévère
- C. Age \geq 80 ans
- D. Poids \leq 60 kg
- E. Créatinine sérique \geq 1,5 mg/dl (133 μ moles/l)

Réponses : C, D, E

QCM 9 : Parmi les activités suivantes, laquelle (lesquelles) est(sont) prise(s) en compte dans l'échelle ADL (Activities of Daily Living) ?

- A. Habillage
- B. Alimentation
- C. Utilisation du téléphone
- D. Gestion des médicaments
- E. Locomotion

Réponses : A, B, E

QCM 10 : Parmi les propositions suivantes concernant les crises d'épilepsie du sujet âgé, laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A. Elles peuvent être dues à une maladie d'Alzheimer
- B. Leur prévalence est plus faible que dans la population adulte jeune
- C. Ce sont souvent des crises partielles complexes
- D. Elles peuvent se manifester par un état de mal d'emblée
- E. Elles imposent la réalisation d'une imagerie cérébrale

Réponses : A, C, D, E