

BLANC-CF-30-Neurologie-QCM-EVC-2025

Q 1. En cas de lésion athéromateuse de l'artère vertébrale droite responsable d'un embolie, où peut se loger cet embolie chez un patient dont l'anatomie est habituelle ?

- ☒ a) dans la protubérance à droite
 - ☒ b) dans la protubérance à gauche
 - ☒ c) dans l'artère cérébrale postérieure droite
 - ☐ d) dans l'artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) gauche
 - ☒ e) dans l'artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) droite
-

Q 2. Quels sont les signes habituellement présents au début d'une maladie de Parkinson ?

- ☒ a) un tremblement de repos unilatéral ou très asymétrique
 - ☒ b) une bradykinésie
 - ☐ c) une dysautonomie sévère empêchant le patient de se lever sans ses bas de contention
 - ☐ d) des troubles cognitifs sévères au stade de trouble neurocognitif majeur
 - ☐ e) un réflexe cutané plantaire en extension du côté du tremblement
-

Q 3. Parmi les causes suivantes, lesquelles sont classiquement responsables de polyneuropathies axonales longueur dépendantes touchant les petites fibres thermo-algiques ?

- ☐ a) le syndrome de Guillain Barré
 - ☒ b) le diabète
 - ☒ c) l'insuffisance rénale chronique
 - ☐ d) les sels de platine
 - ☐ e) les méningoradiculites carcinomateuses
-

Q 4. Quels sont les médicaments habituellement prescrits en prévention secondaire d'un AVC ischémique d'origine athéromateuse ?

- ☒ a) statines
 - ☒ b) antiagrégants
 - ☒ c) antihypertenseurs
 - ☐ d) anticoagulants oraux directs
 - ☐ e) analogues du GLP1
-

Q 5. Parmi les symptômes suivants, lesquels sont classiques dans la sclérose en plaques ?

- ☒ a) neuropathie optique rétro-bulbaire
 - ☐ b) neuropathie optique ischémique antérieure
 - ☐ c) myélite transverse étendue sur plus de 4 corps vertébraux
 - ☐ d) crises d'épilepsie partielle
 - ☒ e) ataxie cérébelleuse
-

Q 6. Parmi les étiologies suivantes, lesquelles peuvent donner une paralysie faciale périphérique ?

- ☒ a) sclérose en plaques
 - ☒ b) zona otitique
 - ☐ c) infarctus du bras postérieur de la capsule interne
 - ☒ d) fracture du rocher
 - ☒ e) maladie de Lyme
-

Q 7. Quels mécanismes parmi les suivants peuvent conduire à une diplopie binoculaire ?

- ☐ a) un infarctus occipital
 - ☒ b) une myasthénie oculaire
 - ☒ c) une myopathie avec atteinte oculomotrice
 - ☐ d) un tumeur de petite taille de l'hémisphère cérébelleux gauche
 - ☐ e) une cataracte sévère de l'oeil droit
-

Q 8. Parmi les mécanismes suivants, lesquels peuvent-ils être responsables d'une confusion chez un patient de 38 ans sans antécédent ?

- ☐ a) une rétention aiguë d'urines
 - ☐ b) un fécalome
 - ☒ c) une hypoglycémie profonde
 - ☒ d) une intoxication au monoxyde de carbone
 - ☐ e) une myasthénie généralisée auto-immune
-

Q 9. Quels éléments peut-on observer habituellement dans une syncope convulsivante ?

- ☒ a) une perte de connaissance brutale
 - ☐ b) un retour très lent à un état de vigilance normal, au total plus d'une heure
 - ☐ c) une morsure latérale de langue
 - ☒ d) des mouvements brusques non contrôlés des membres supérieurs
 - ☒ e) une amnésie de la perte de connaissance
-

Q 10. Quelles sont les signes radiologiques classiques de maladie d'Alzheimer ?

- ☐ a) une dilatation majeure des ventricules latéraux
 - ☒ b) une atrophie hippocampique
 - ☐ c) des hypersignaux confluents de la substance blanche
 - ☐ d) des microsaignements exclusivement corticaux
 - ☒ e) une atrophie corticale
-