

Q 1. A propos de l'infection herpétique

- ☒ a) La primo-infection herpétique est souvent asymptomatique
 - ☒ b) En bouche, une lésion d'herpès buccal se traduit par une érosion post-vésiculeuse, le plus souvent
 - ☒ c) La primo-infection herpétique correspond à l'infection des cellules épithéliales puis nerveuses sensibles du nerf trijumeau
 - ☒ d) Le diagnostic de l'herpès buccal est essentiellement clinique
 - ☐ e) La récurrence herpétique est uniquement retrouvée chez l'enfant
-

Q 2. A propos de l'aphtose

- ☐ a) La correction d'un déficit vitaminique est toujours efficace dans le traitement de l'aphtose ; il n'y a plus de poussées
 - ☐ b) L'arrêt du tabac diminue la fréquence de survenue des ulcérations
 - ☒ c) Des carences en fer, en acide folique, en vitamine B et en zinc ont été mises en évidence chez des patients atteints d'aphtose buccale
 - ☐ d) La présence d'aphtes est un critère diagnostique obligatoire dans la maladie de Behçet
 - ☒ e) La présence d'ulcérations aphtoïdes peut être associée à de nombreuses pathologies systémiques
-

Q 3. A propos des anticoagulants oraux directs

- ☐ a) Ils regroupent : Anti-vitamines K (AVK), héparines et antiagrégants plaquettaires (AAP)
 - ☒ b) Trois molécules en font partie : dabigatran, rivaroxaban, apixaban
 - ☐ c) En routine, un test sanguin est nécessaire pour vérifier la puissance de leur anticoagulation
 - ☐ d) Quelle que soit la chirurgie orale programmée, une fenêtre thérapeutique sera envisagée
 - ☒ e) Les chirurgies à faible risque hémorragique peuvent être effectuées sans modification de leur posologie et schéma d'administration
-

Q 4. Cochez les réponses justes à propos des facteurs de risque des cancers de la cavité buccale

- ☐ a) les hydrocarbures contenus dans la fumée du tabac empêchent l'absorption des vitamines
 - ☒ b) L'éthanol a une action irritante directe, par contact
 - ☒ c) L'alcool solubilise les substances carcinogènes du tabac et favorise leur passage à travers les membranes cellulaires
 - ☒ d) la forme érosive du lichen buccal a un risque de dégénérescence élevé
 - ☐ e) les leucoplasies homogènes, blanches et souples ne nécessitent pas l'arrêt de la consommation alcoolotabagique pour régresser
-

Q 5. Les conditions suivantes favorisent l'apparition de mycoses buccales à Candida

Albicans :

- ☒ a) antibiothérapie à large spectre
 - ☒ b) hyposialie
 - ☐ c) avulsion des dents de sagesse
 - ☒ d) immunodépression
 - ☐ e) prise d'oestro-progestatifs
-

Q 6. Chez un patient à haut risque d'endocardite infectieuse, les actes suivants sont contre-indiqués :

- ☐ a) La chirurgie endodontique combinée avec la reprise du traitement endodontique de la dent causale par voie orthograde
 - ☒ b) L'utilisation de membranes pour la régénération osseuse guidée
 - ☐ c) La traction orthodontique d'une canine incluse
 - ☒ d) Le traitement chirurgical d'une péri-implantite
 - ☐ e) La pose d'implants dentaires
-

Q 7. Chez les patients ayant un débit de filtration glomérulaire <30 mL/min/1,73m² de plus de 3 mois :

- ☒ a) Une antibioprophylaxie doit être prescrite systématiquement avant un acte de chirurgie orale
 - ☐ b) En post-opératoire, une prescription d'anti-inflammatoire non stéroïdien est préférable à la prescription de paracétamol
 - ☒ c) Concernant les prescriptions, les posologies doivent être réduites ou les prises doivent être espacées
 - ☒ d) Le risque hémorragique est accru
 - ☒ e) Le diabète représente la cause la plus fréquente de cette pathologie
-

Q 8. A propos de la colique salivaire d'origine lithiasique, quelles sont la ou les réponses exacte(s)

- ☐ a) le scanner injecté en première intention permettra de faire le diagnostic
 - ☐ b) la submandibulectomie est indiquée après deux épisodes de submandibulite
 - ☐ c) la taille du canal de Sténon est indiquée pour les lithiases antérieures
 - ☒ d) la sialendoscopie est à but diagnostique et thérapeutique
 - ☒ e) la panoramique dentaire et le mordue antérieur permettent de déceler des lithiases radio-opaques
-

Q 9. Dans le cadre des traumatismes dentaires, quelles sont la ou les réponses exacte(s)

- ☐ a) Il faut réimplanter et contenir les dents lactéales
 - ☐ b) toutes les dents traumatisées doivent faire l'objet d'un traitement endodontique initial
 - ☒ c) les dents traumatisées mais vivantes peuvent développer une résorption externe à distance
 - ☐ d) seules les fractures dentaires avec exposition pulpaire sont à l'origine de mortification dentaire
 - ☒ e) la contention collée est un moyen efficace pour immobiliser une dent réimplantée
-

Q 10. A propos du lichen plan buccal, quelles sont la ou les réponses exacte(s)

- ☐ a) La gencive attachée est toujours épargnée
 - ☒ b) La corticothérapie locale est efficace sur les poussées de lichen
 - ☐ c) Il est indiqué de retirer toutes les zones blanches pour analyse histopathologique
 - ☒ d) c'est une lésion pré-cancéreuse
 - ☒ e) il existe des formes bipolaires ou cutanées
-