

Q 1. Parmi les propositions suivantes concernant l'otospongiose, la- ou laquelle(s) est/sont exacte(s) ?

- ☒ a) L'audiogramme montre typiquement une encoche en conduction osseuse à 2 kHz
 - ☐ b) Le tympan est épaissi et inflammatoire
 - ☒ c) La stapédotomie est un traitement possible
 - ☒ d) Le scanner des rochers peut être utile au bilan préopératoire
 - ☒ e) Une atteinte cochléaire peut entraîner une surdité mixte
-

Q 2. Un enfant de 12 ans présente une otorrhée chronique avec granulome attical évoquant le diagnostic de cholestéatome, parmi les propositions suivantes la- ou laquelle(s) est/sont exacte(s) ?

- ☒ a) Le diagnostic le plus probable est celui de cholestéatome acquis
 - ☐ b) Le diagnostic le plus probable est celui de cholestéatome congénital
 - ☒ c) Il peut entraîner une érosion ossiculaire ou une paralysie faciale
 - ☐ d) Un traitement médical seul permet la guérison
 - ☒ e) Le traitement de référence est chirurgical
-

Q 3. Un patient de 62 ans présente un carcinome épidermoïde T2 N1 M0 de la langue mobile. Quelles affirmations sont correctes ?

- ☒ a) Le bilan d'extension comprend un scanner cervico-thoracique
 - ☒ b) Une IRM linguale peut préciser l'extension en profondeur
 - ☒ c) Le curage ganglionnaire homolatéral est indiqué
 - ☐ d) La radiothérapie exclusive est le traitement de choix
 - ☒ e) L'envahissement périnerveux est un facteur péjoratif
-

Q 4. Une fillette de 2 ans, opérée récemment de l'œsophage, présente une dyspnée inspiratoire post-opératoire. La nasofibroscopie montre une immobilité bilatérale des cordes en position médiane. Quelles propositions sont exactes ?

- ☒ a) L'étiologie peut être iatrogène (atteinte des deux nerfs récurrents)
 - ☒ b) La trachéotomie est parfois nécessaire en urgence
 - ☒ c) La cordectomie bilatérale élargit l'espace glottique mais altère la voix
 - ☒ d) L'électromyographie laryngée aide au pronostic
 - ☐ e) La récupération spontanée est fréquente à 2 ans
-

Q 5. Une patiente de 35 ans présente un nodule thyroïdien Bethesda V de 15 mm. Quelles sont la ou les propositions exactes ?

- ☒ a) Une chirurgie thyroïdienne (lobo-isthmectomie ou totale) est recommandée
 - ☐ b) Le curage prophylactique latéral est systématique
 - ☒ c) Le monitoring du nerf récurrent est recommandé mais non obligatoire
 - ☒ d) L'histologie la plus fréquente est le carcinome papillaire
 - ☒ e) Une atteinte de l'aire ganglionnaire VI est fréquente
-

Q 6. Un enfant de 7 ans présente une tuméfaction palpébrale douloureuse avec fièvre. Vous suspectez une ethmoïdite aiguë et le scanner retrouve une collection sous-périostée interne de 6 mm de diamètre. Quelles est (sont) la (les) affirmation(s) juste(s) ?

- ☒ a) Vous évoquez un abcès orbitaire stade III de Chandler
 - ☐ b) L'IRM cérébrale est indispensable avant toute chirurgie
 - ☐ c) L'antibiothérapie intraveineuse seule suffit toujours
 - ☒ d) La chirurgie endonasale est une option thérapeutique
 - ☒ e) Le drainage externe par voie de Lynch est une option thérapeutique
-

Q 7. Une femme de 40 ans consulte pour une sensation de boule dans la gorge depuis plusieurs mois. L'examen clinique et la nasofibroscopie sont normaux. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?

- ☒ a) Globus pharyngé
 - ☐ b) Cancer de l'hypopharynx
 - ☐ c) Goître
 - ☒ d) Reflux pharyngo-laryngé
 - ☐ e) Pharyngite chronique
-

Q 8. Un homme de 50 ans fumeur consulte pour une tuméfaction cervicale paramédiane droite douloureuse et une fièvre à 39 °C survenant dans les suites d'une infection virale. À l'examen, vous observez une masse inflammatoire. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ a) Adénopathie métastatique
 - ☒ b) Adénophlegmon cervical
 - ☐ c) Kyste du tractus thyroïdienne
 - ☐ d) Goître nodulaire
 - ☐ e) Kyste congénital de la 4ème poche
-

Q 9. Concernant la surdité brusque chez l'adulte, quelles est(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- ☐ a) L'étiologie est le plus souvent auto-immune
 - ☒ b) La corticothérapie est le traitement de référence
 - ☒ c) Une étiologie virale est possible
 - ☒ d) L'IRM doit être systématique
 - ☒ e) La récupération spontanée est possible
-

Q 10. À propos des épistaxis de l'adulte, quelles sont les propositions exactes ?

- ☒ a) Elles siègent le plus souvent en zone de Kiesselbach
 - ☒ b) Le méchage antérieur est une option thérapeutique
 - ☒ c) L'abord endoscopique de l'artère sphéno-palatine peut être nécessaire
 - ☐ d) L'hypertension artérielle est une cause fréquente directe
 - ☒ e) L'électrocoagulation est un traitement possible
-