

BLANC-CF-17-Gynécologie médicale-QCM-EVC-2025

Q 1. Vous voyez en consultation Mme R... âgée de 51 ans qui vient de commencer depuis 1 mois un traitement hormonal de ménopause (THM) associant un patch bihebdomadaire transdermique à 50 microgr/j associé à 100 mg de progestérone selon un schéma combiné continu pour des troubles climatiques. Elle est inquiète car depuis 3 jours, elle a des saignements menstruels dans un contexte de douleurs pelviennes. Qu'en pensez vous et que lui proposez vous?

- ☐ a) Vous la rassurez et vous lui demandez d'augmenter la dose de progestérone à 200 mg/j
 - ☐ b) Vous prévoyez en urgence une hystéroscopie diagnostique
 - ☐ c) Vous faites à la consultation une biopsie de l'endomètre
 - ☒ d) Vous la rassurez car il s'agit très probablement d'une résurgence ovarienne et lui demander d'interrompre transitoirement le THM
 - ☐ e) Vous la rassurez et vous lui demandez d'augmenter la dose des estrogènes
-

Q 2. Quels sont parmi les évènements suivants, celui ou ceux qui contre-indiquent chez une femme récemment ménopausée, un traitement hormonal de ménopause associant l'estradiol par voie cutanée et la progestérone micronisée ?

- ☒ a) Un antécédent personnel d'infarctus du myocarde
 - ☐ b) Un antécédent personnel de thrombophlébite sur plâtre survenue 10 ans au préalable
 - ☐ c) Un antécédent maternel de cancer du sein
 - ☒ d) Le lupus systémique avec SAPL
 - ☐ e) Un antécédent de migraine avec aura ayant contre-indiqué la contraception oestroprogestative combinée
-

Q 3. Quels sont les éléments diagnostics du syndrome des ovaires polykystiques?

- ☒ a) un trouble du cycle menstruel
 - ☐ b) une obésité abdominale
 - ☐ c) une obésité gynoïde
 - ☒ d) une AMH élevée
 - ☐ e) une échographie par voie sus pubienne avec plus de 20 follicules par ovaire
-

Q 4. Quelles sont les caractéristiques d'une dysménorrhée liée à l'endométriose?

- ☐ a) survenue dès les premières règles
 - ☒ b) aggravation progressive avec l'âge
 - ☒ c) associée à des signes digestifs
 - ☒ d) intensité importante
 - ☐ e) associée à des céphalées
-

Q 5. A qui peut-on proposer une prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation (AMP) avec remboursement à 100% en France?

- ☒ a) Une femme non mariée de 42 ans
 - ☒ b) Un couple hétérosexuel non marié infertile avec une femme de 24 ans et un homme de 31 ans ayant tous les deux une couverture sociale par la CMU
 - ☐ c) Un couple de femmes mariées de 31 et 39 ans ayant toutes les deux une couverture sociale par l'AME (Aide Médicale d'Etat)
 - ☒ d) Un homme trans de 25 ans non marié ayant conservé son utérus et son genre assigné à la naissance à l'état civil (F)
 - ☐ e) Un couple hétérosexuel infertile marié avec une femme de 41 ans et un homme de 62 ans
-

Q 6. Au cours de la grossesse, certains vaccins sont essentiels.

- ☒ a) Ils peuvent être prescrits par le gynécologue ou la sage-femme.
 - ☐ b) Il est recommandé de réaliser une vaccination contre la tuberculose en début de grossesse en cas de facteur de risque tel que séjour dans un pays à risque, cas familial récent de tuberculose ou résidence en Ile-de-France.
 - ☒ c) La vaccination contre le ROR (Rougeole Oreillon Rubéole) est contre-indiquée pendant la grossesse.
 - ☒ d) Le vaccin contre la coqueluche est recommandé à partir du 4^e ou 5^e mois et ce pour chaque grossesse.
 - ☐ e) Le vaccin contre la bronchiolite est préconisé dès le 1^{er} mois, en période automnale.
-

Q 7. Mme A. 17 ans consulte pour un retard de règles. Elle a des rapports sexuels depuis environ 1 an. Elle rapporte des oublis de pilule. Le dosage de β -hCG est positif. Elle ne souhaite pas garder la grossesse. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ a) L'accord d'un titulaire de l'autorité parentale est nécessaire avant de réaliser une IVG
 - ☒ b) La patiente aura obligatoirement un entretien social avant la réalisation de l'IVG
 - ☒ c) La patiente peut être prise en charge de manière anonyme
 - ☒ d) L'IVG peut être réalisée si la datation de la grossesse est inférieure à 16 semaines d'aménorrhée
 - ☒ e) L'IVG peut être effectuée en ville si la datation de la grossesse est inférieure à 9 semaines d'aménorrhée
-

Q 8. Mme V, 29 ans consulte pour initier une contraception. Elle souhaiterait une contraception par pilule œstroprogestative.

Quel(s) élément(s) de l'interrogatoire et/ou de l'examen clinique vous conduirai(en)t à contre-indiquer formellement cette contraception ?

- ☒ a) Antécédent personnel d'HTA équilibrée sous monothérapie
 - ☐ b) Antécédent familial de cancer du sein chez la mère à 35 ans
 - ☒ c) Antécédent familial d'embolie pulmonaire chez la sœur à 35 ans
 - ☐ d) Présence d'un IMC à 31kg/m²
 - ☐ e) Présence d'un tabagisme à 10 cigarettes/jour
-