

# DERMATOLOGIE

## Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

### Question N°1 :

Quel est le principal critère pronostique histologique du mélanome primitif.

### Question N°2 :

Citer les deux modalités thérapeutiques possibles pour traiter un érysipèle chez un patient allergique à l'amoxicilline.

### Question N°3 :

Quelles sont les deux hémopathies qui sont le plus souvent à l'origine d'un prurit sine materia ?

### Question N°4 :

Quel traitement instituez-vous en cas d'échec d'un antihistaminique anti-H1 de 2eme génération (par exemple : desloratadine) à 1 comprimé par jour pour une urticaire chronique ?

### Question N°5 :

Citez au moins 3 dermatoses transitoires du nouveau-né.

### Question N°6 :

Citez deux scores (1 subjectif + 1 objectif) pour évaluer la sévérité d'un psoriasis au cours d'une consultation ?

### Question N°7 :

Quels sont les 3 principaux types cliniques de carcinomes basocellulaires ?

### Question N°8 :

Quel est le traitement d'une acné sévère en cas d'échec des cyclines per os ?

### Question N°9 :

Citez 3 facteurs de risque à rechercher chez un patient ayant un mélanome ?

### Question N°10 :

Comment traiter un impétigo simple, non étendu, sans signe de gravité ?

### Question N°11 :

Quelle est la principale infection cutanée à rechercher devant un prurit généralisé ?



Question N°12 :

Quels sont les 2 terrains favorisant de l'urticaire chronique ?

Question N°13 :

Quelle est la cause la plus fréquente d'une urticaire aiguë de l'enfant ?

Question 14 :

Quelles sont les comorbidités à rechercher chez un patient psoriasique ?

Question N°15 :

Quelle est la voie moléculaire impliquée dans la physio-pathogénie des carcinomes baso-cellulaires ?

Question N°16 :

Quel rythme de surveillance médicale est recommandé chez les garçons traités par isotrétinoïne pour une acné sévère ? Justifiez

Question N°17 :

Quelle est la prise en charge thérapeutique en cas de mélanome de Breslow 2,5 mm isolé sans métastase à distance ?

Question N°18 :

Quel germe suspectez-vous devant une dermohypodermite suppurative de la main d'aggravation rapide quelques heures après morsure d'animal ?

Question N°19 :

Quelle est l'infection systémique la plus fréquente à rechercher devant un prurit généralisé ?

Question N°20 :

Citez 3 co-morbidités atopiques à rechercher devant une dermatite atopique de l'enfant ?

Question N°21 :

Classez les formes d'épidermolyses bulleuses de la plus bénigne à la plus grave : épidermolyse bulleuse dystrophique (EBD), épidermolyse bulleuse simplex (EBS), épidermolyse bulleuse jonctionnelle (EBJ).

Question N°22 :

Quelle thérapeutique locale d'entretien prescrire en première intention chez un patient psoriasique en plaques touchant moins de 10% de la surface corporelle ?

Question N° 23 :

Quels sont les 4 grands types histologiques des carcinomes basocellulaires ?

Question N° 24 :

Quelle autre atteinte d'organe doit être recherchée au cours d'une rosacée ?

Question N°25 :

Si le ganglion sentinelle est positif pour un mélanome de Breslow 1,2 mm, quelle est l'étape thérapeutique suivante ?

Question N° 26 :

Quelle dermatose suspectez-vous chez une femme de 65 ans avec un prurit vulvaire et un encapuchonnement clitoridien ?

Question N° 27 :

Quels sont les 2 principaux auto-anticorps à rechercher pour diagnostiquer un lupus érythémateux aigu ?

Question N° 28 :

En cas de dermatite atopique mal contrôlée par les dermocorticoïdes avec des lésions eczématiformes survenant sur des zones habituellement non touchées par la dermatite atopique, que devez-vous proposer comme explorations complémentaires diagnostiques ?

Question N° 29 :

Quelle génodermatose doit être évoquée chez un nourrisson présentant des spasmes en flexion et des macules hypochromiques ?

Question N° 30 :

Quand faut-il initier un traitement systémique chez un patient adulte atteint de psoriasis ?

Question N° 31 :

Quel est le nom du syndrome génétique prédisposant à des carcinomes basocellulaires multiples à un âge précoce ?

Question N° 32

Comment s'appelle la forme nécrotique et creusante d'un impétigo ?

Question N° 33 :

Si le ganglion sentinelle est positif lors du bilan initial du mélanome, faut-il faire un curage ganglionnaire ?



Question N° 34 :

Quel germe est impliqué dans la majorité des néoplasies intraépithéliales de la vulve ?

Question N° 35 :

Citer 3 lésions fondamentales à rechercher pour faire un diagnostic de lupus discoïde ?

Question N° 36 :

En cas d'échec des antihistaminiques à posologies augmentées dans l'urticaire chronique, quels sont les 2 traitements ayant une efficacité clinique validée actuellement dans cette indication ?

Question N° 37 :

Citez 3 signes dermatologiques qui font évoquer une neurofibromatose de type 1 chez un enfant ?

Question N° 38 :

Citez 2 traitements systémiques pouvant être proposés en première intention chez un patient adulte sans comorbidité, atteint de psoriasis en plaques ?

Question N° 39 :

Citez 2 méthodes non chirurgicales de traitement d'un carcinome baso-cellulaire superficiel.

Question N° 40 :

Que proposer après la guérison d'une poussée de furonculose, pour limiter le risque de récurrences ?

Question N° 41 :

Quel est le rythme de surveillance clinique chez un patient ayant eu un mélanome in situ ?

Question N° 42 :

Quel est le traitement de référence (molécule, posologie et voie d'administration) d'une urétrite gonococcique ?

Question N° 43 :

Quelles sont les 3 phases successives du syndrome de Raynaud (dans l'ordre) ?

Question N° 44 :

En cas d'urticaire au froid, citez une des 2 types d'atteintes pouvant mettre en jeu la vie ?

Question N° 45 :

Citez au moins 3 complications possibles d'un hémangiome infantile étendu de la face.

Question N° 46 :

Quel bilan paraclinique faire avant mise sous méthotrexate chez une femme jeune psoriasique sans comorbidité ?

Question N° 47 :

A quel rythme d'application et pendant combien de temps doit être traité un carcinome baso-cellulaire superficiel avec l'imiquimod 5% ?

Question N° 48 :

Quels sont les 3 stades de la rosacée ?

Question N° 49 :

Quelle est la toxidermie la plus fréquente ?

Question N° 50 :

Citez deux cibles antigéniques de la pemphigoïde bulleuse.

Question N° 51 :

Quel est le traitement systémique de référence de la rosacée papulo-pustuleuse diffuse ?

Question N° 52 :

A quel rythme et sur quelle durée appliquez-vous l'imiquimod 5% pour le traitement des kératoses actiniques ?

Question N° 53 :

Quelles sont les indications pour débiter une biothérapie dans le psoriasis ?

Question N° 54 :

Selon l'AMM quelles sont les 4 indications du propranolol dans l'hémangiome infantile ?

Question N° 55 :

Citez 2 facteurs déclenchants de l'urticaire cholinergique ?

Question N° 56 :

Quelle atteinte sévère doit être recherchée systématiquement chez un patient chez qui vous venez de diagnostiquer une pemphigoïde cicatricielle (ou pemphigoïde des muqueuses) ?

Question N° 57 :

Citez 2 virus pouvant être réactivés au cours du DRESS ?

Question N° 58 :

Quelle famille de topiques est contre-indiquée dans la rosacée ?

Question N° 59 :

Citez les 3 catégories d'allergènes de contact les plus fréquemment en cause dans les eczémas de contact allergique en France.

Question N° 60 :

Comment appelle-t-on les naevus à croissance rapide, de coloration rouge-chamois, en dôme chez l'enfant ?

Question N° 61 :

Un carcinome baso-cellulaire infiltrant a été opéré avec une marge clinique de 5 mm et le compte rendu histologique conclut que la marge profonde est à moins de 1mm. Faut-il une reprise chirurgicale ? Pourquoi ?